

OCT 3 0 1929

EN VENTE CHEZ L'AUTEUR

(Prix du présent fascicule : 2 fr.)

72,896

**MÉLANGES**  
**EXOTICO-ENTOMOLOGIQUES**

LIBRARY  
ENTOMOLOGY  
CAMBRIDGE, MASS.

QUATRIÈME FASCICULE

(18 Septembre 1912)

PAR

**MAURICE PIC**

OFFICIER D'ACADÉMIE  
CHEVALIER DU MÉRITE AGRICOLE  
DIRECTEUR DE L'« ÉCHANGE »  
CORRESPONDANT DU MUSÉUM DE PARIS  
MEMBRE DE NOMBREUSES SOCIÉTÉS SCIENTIFIQUES  
DE FRANCE ET DE L'ÉTRANGER

MOULINS

IMPRIMERIE ÉTIENNE AUCLAIRE

ANCIENNE MAISON C. DESROSIERS

1912 S.

Tous droits réservés

Y 87 88 11  
Y 10 1008 21 00 10 11  
1 0 11 31 0 11 11 11

# SUR LES « HAPALOCHROUS » Er. AFRICAINS <sup>(1)</sup>

## A ÉLYTRES BICOLORES

---

Les espèces étudiées ici sont de grande taille pour le genre, rarement de taille moyenne, elles sont, soit testacées avec des macules, ou fascies, métalliques vertes ou bleues, soit métalliques avec des macules latérale et apicale testacées. Plusieurs espèces ont les antennes flabellées chez ♂, simples chez ♀, ce sont : *H. Erichsoni* Roth., *sumptuosus* Boh., *senegalensis* n. sp. Les ♂ ont d'ordinaire le prothorax entièrement métallique, mais, chez plusieurs espèces, cet organe est, chez les ♀, testacé avec une macule métallique foncée.

Toutes ces nouveautés font partie de ma collection, ainsi que les anciennes espèces, sauf *nobilis* Er., qui m'est resté inconnu.

- 1 Elytres testacés sur une partie plus ou moins grande de leur base, au moins testacés sur leur milieu, d'où suture plus ou moins, ou entièrement, testacée. 3
- 1' Elytres à suture foncée, ces organes entièrement métalliques sur leur milieu, offrant seulement une macule apicale et une autre externe près du milieu, celles-ci testacées. 2
- 2 Prothorax ruguleux sur les côtés ; élytres à macule apicale flave en forme de croissant (ex Erichson). Angola.  
**nobilis** Er.
- 2' Prothorax à ponctuation écartée, non ruguleux sur les côtés ; élytres à macule apicale remontant assez haut

---

(1) Dans cette étude n'est pas comprise, naturellement, la petite espèce égyptienne *H. flabellicornis* Er. dont le ♂ a les antennes flabellées, car elle ne rentre pas dans la faune limitée traitée ici.

sur la suture, tronquée, ou subtronquée, sur sa partie antérieure. ♂ à antennes simples. Long. 6,5-7,5 mill. Benguela, Congo, Gabon. **longior** Pic.

3 Elytres offrant des macules, ou fascies, métalliques, antérieure et postérieure, distantes l'une de l'autre. 4

3' Elytres avec une fascie discale métallique à contours irréguliers, plus ou moins étranglée vers le milieu, qui atteint presque le sommet. ♂ antennes flabellées. Long. 5-6,5 mill. Abyssinie, Zanguebar. **Erichsoni** Roth.

4 Elytres ayant, sur chaque élytre, une macule métallique antérieure (atteignant, ou non, la base) isolée de la suture. 6

4' Elytres avec une bande métallique basale complète, à contours postérieurs sinués et ornés, en outre, d'une 2<sup>e</sup> bande postmédiane. 5

5 Prothorax presque lisse, à ponctuation très clairsemée ; élytres plus longs, plus fortement ponctués, 1<sup>re</sup> bande non échancrée par la couleur claire sur la suture, 2<sup>e</sup> très sinuée et oblique, macule apicale claire grande, remontant assez haut sur la suture. ♂ inconnu. Long. 7 mill. W. Africa. **Jansoni** n. sp.

5' Prothorax à ponctuation assez fine mais dense ; élytres assez courts, à ponctuation dense et peu forte ; 1<sup>re</sup> bande échancrée sur la suture par la couleur claire, 2<sup>e</sup> large, presque droite, macule apicale claire plus petite. ♂ antennes flabellées, celles-ci et pattes testacées avec seulement le sommet des cuisses postérieures foncé. Long. 6 mill. Sénégal. **senegalensis** n. sp.

6 Macule antérieure métallique n'atteignant pas la base des élytres. ♂ inconnu. 7

6' Macule antérieure métallique couvrant la base des élytres ; ♂ à antennes flabellées. Cette espèce varie : Quand les macules sont très élargies et couvrent les bords antérieurs, c'est la var. nov. **nyassensis** dont je possède une

femelle de Nyassa (1). Long. 6,5-9 mill. Presque toute l'Afrique orientale : Caffrerie, Erythrée, Beira, etc.

**sumptuosus** Boh.

7 Très allongé ; prothorax entièrement métallique ; macule antérieure des élytres assez éloignée de la base ; pattes bicolores. Long. 8 mill. Sénégal. **festivus** Er.

7' Peu allongé ; prothorax testacé à macule discale médiane métallique verte ; macule antérieure des élytres très rapprochée de la base, rétrécie en avant ; pattes entièrement foncées. Long. 7 mill. Afrique orientale.

**viridipes** n. sp.

Les trois espèces nouvelles que je viens de signaler se distinguent entre elles de la façon suivante :

1 Une bande métallique basale sur les élytres ; prothorax entièrement métallique. 2

1' Elytres avec une macule basale métallique allongée et isolée de la suture ; prothorax testacé, à macule discale verte. **viridipes** Pic.

2 Ponctuation presque semblable sur le prothorax et les élytres, dense et fine ; bande postérieure métallique des élytres non oblique et moins éloignée du sommet.

**senegalensis** Pic.

2' Ponctuation très dissemblable sur le prothorax et les élytres, presque nulle sur le 1<sup>er</sup>, forte sur les élytres ; bande postérieure métallique des élytres oblique et plus éloignée du sommet. **Jansoni** Pic.

---

(1) Je possède, en outre, reçue depuis peu, une ♀ provenant de l'Afr. or. qui a sur le prothorax, de chaque côté de sa grosse macule métallique médiane, une petite macule métallique, c'est la variété nouvelle **signaticollis**.

---

# Descriptions de 36 Espèces

## ET VARIÉTÉS DIVERSES

---

Les *types* de toutes les nouveautés ci-dessous décrites font partie de ma collection.

**Ptinus inhumeralis** n. sp. Ovale allongé, un peu brillant, noir à reflets métalliques, roussâtre par place (sur les bords du prothorax, la suture et la base des élytres), membres paraissant roussâtres, peu pubescent, orné de quelques longs poils dressés. Prothorax pas très long, élevé en bosse sur chaque côté latéralement, densément et granuleusement ponctué ; élytres assez longs, rétrécis aux deux extrémités, fortement strié-ponctués avec les interstries étroites, subcarénés, épaulés non marquées. Long, 2,5 mill. Chili : Santiago (P. Germain).

Par sa forme, voisin de *elegans* Sol., mais prothorax différent, élytres à côtes très marquées et sans fascies, etc.

**Ptinus Reedi** n. sp. Ovalaire, assez large, brillant, roux, pubescent de gris et orné de poils clairs dressés assez nombreux, membres testacés. Prothorax très garni de longs poils mais sans houpettes bien marquées ; élytres courts et larges, un peu rétrécis aux deux extrémités, nettement strié-ponctués, les points des stries étant larges et subcarrés, interstries étroites, saillants. Long. 2 mill. environ. Chili (Reed). — Me vient de la coll. Armitage.

De forme plus robuste que le précédent, bien plus garni de pubescence et d'une coloration générale uniforme plus claire.

**Haplobothris nigronotatus** n. sp. Allongé, presque mat, noir avec les côtés du prothorax, la partie médiane et le bord latéral antérieur des élytres testacés. Long. 5,5 mill. Brésil : Blumenau.

Très voisin de *peruvianus* Pic, par sa coloration, mais le noir du prothorax est plus distinctement limité, la coloration testacée est plus étendue sur la partie antérieure externe des élytres, enfin la ponctuation de ces derniers organes est plus profonde.

**Cantharis niasensis** n. sp. Un peu allongé, subparallèle, brillant sur l'avant-corps avec les élytres peu densément pubescents de gris, noir avec la majeure partie de la tête, le prothorax, l'écusson, la base des élytres, les hanches et l'extrême base des cuisses testacés ; antennes aplaties sur leur milieu, noires avec le sommet du dernier article testacé ; prothorax plus long que large, rétréci et arqué en avant, impressionné sur le disque ; élytres un peu plus larges que le prothorax, subparallèles, ruguleux avec des traces de faibles côtes. Long. 9 mill. Ile Nias (coll. Pic).

Diffère de *sordidus* Gorh. (ex co-type in coll. Pic) par le prothorax un peu moins court et la coloration claire réduite sur la base des élytres.

**Cantharis testaceidens** n. sp. Assez court et relativement robuste, pubescent de gris, peu brillant, entièrement noir avec seulement les mandibules testacées, la base des antennes et partie des tibias roussâtres, l'abdomen bordé de flave. Tête robuste ; antennes un peu épaissies ; prothorax subcarré, un peu saillant vers les angles postérieurs ; élytres un peu plus larges que le prothorax, peu longs, subparallèles, modérément ponctués. Long. près de 6 mill. Célèbes (coll. Pic).

Voisin de *Staudingeri* Pic et distinct par la tête plus robuste et le prothorax non bordé de testacé.

**Discodon Mathani** n. sp. Allongé, subparallèle, brillant, pubescent de gris, noir avec le devant de la tête, les côtés latéraux du prothorax largement, les palpes, les trois derniers articles des antennes et les pattes, à l'exception des tarsi qui sont noirs, d'un testacé pâle. Tête moyenne, noire derrière les antennes, testacée en avant ; antennes longues, comprimées et aplaties sur leur milieu, atténuées

à l'extrémité, noires avec la base du 1<sup>er</sup> article et les trois derniers articles testacés ; prothorax subtransversal, pas très court, un peu rétréci et arqué en avant, sinué latéralement, sans échancrure nette, testacé avec une bande médiane foncée large, droite sur les côtés et presque complète ; élytres peu plus larges que le prothorax, distinctement étranglé-rétrécis en dessous du milieu, brillants, plus ou moins ruguleusement ponctués. Long. 10 mill. Brésil : Para (de Mathan).

Par la forme de ses antennes se rapproche de *notaticorne* Pic et espèces voisines dont il se distingue par la coloration plus foncée des antennes et le prothorax orné d'une macule discale foncée ; de coloration rappelle *limbaticolle* Pic, mais ce dernier est moins brillant et a un prothorax un peu plus large et plus étroitement bordé de testacé sur les côtés.

**Daiphron brevinotatum** n. sp. Modérément allongé, élargi en arrière, brillant, noir avec le devant des yeux et le pourtour du prothorax testacés, ce dernier en carré long ; élytres testacés sur leur première moitié et marqués, de chaque côté, derrière l'écusson, d'une macule noire allongée (ces macules parfois indistinctes ; var. nov. **innotatum**), d'un noir bleuté métallique sur la moitié apicale, avec une côte discale nette ; antennes faiblement aplaties. Long. 13 mill. Brésil (coll. Pic).

Cette nouveauté est à placer près de *lyciforme* Gorh.

**Daiphron ochraceum** var. nov. **lineatum**. Prothorax allongé, testacé à bande noire, étroite, complète, écusson noir, élytres testacés avec la suture étroitement bordée de noir sur le tiers antérieur. Panama (ex Champion). A été signalé par Gorham sans être nommé (*Biol.* p. 277). Cette variété me vient de la collection Gorham.

**Polemium Rouyeri** n. sp. Large, presque mat, noir avec le dessus du corps presque entièrement testacé-rougeâtre. Tête courte, noire à bande rouge médiane ; antennes courtes, aplaties, à articles intermédiaires anguleux au sommet ; prothorax court et large, subcaréné en avant, sinué



latéralement et postérieurement avec une sorte de callosité latérale et une faible échancrure devant les angles postérieurs qui sont saillants, cet organe testacé, bimaculé de noir sur le disque ; écusson noir ; élytres un peu plus larges que le prothorax à la base, élargis et explanés vers le milieu, un peu rétrécis au sommet, marqués de faibles côtes. Long. 14 mill. Java (Rouyer).

Plus large que *depressus* Gorh. et de coloration différente.

**Polemius ruficolor** n. sp. Par sa coloration, analogue au précédent, mais tête entièrement testacée derrière les yeux et écusson testacé, en outre prothorax immaculé, de forme différente, subarqué sur le milieu des côtés avec les angles postérieurs très saillants, les élytres de forme plus parallèle et les antennes moins épaisses. Long. 12 mill. Java : Monts Tengger (Fruhstorfer).

**Silis subnigronotata** n. sp. Allongé, subparallèle, un peu brillant, pubescent de gris, noir avec le devant de la tête, l'extrémité des antennes, les tibias, l'abdomen, le prothorax (celui-ci orné d'une macule noire placée au milieu de sa base) et les élytres, sauf l'extrémité noire, testacés. Tête avec les yeux large, dépassant un peu les bords antérieurs du prothorax ; antennes assez longues, faiblement épaissies à la base, noires avec les 4 derniers articles testacés ; prothorax presque carré, en arc de cercle en avant, droit sur les côtés ; élytres un peu plus larges que le prothorax, longs, subparallèles, très faiblement costulés. Long. 8,5-9 mill. Ile Batjan.

Espèce de forme particulière ayant un faux air de *Tylocerus* Dalm. allongé. Peut prendre place, provisoirement, près de *S. hamata* Gorh.

**Incisosilis pallidus** n. sp. Large, brillant, pubescent de gris, entièrement testacé, sauf les yeux, les tarses et les articles 4 et suivants des antennes qui sont noirs, tête marquée en arrière d'une petite macule foncée. Long. 6 mill. Brésil : Bahia.

Très voisin de *latipennis* Pic, un peu moins robuste, avec

les élytres non profondément entaillés, mais simplement sinués au sommet, prothorax un peu plus entaillé latéralement, à lobe postérieur émoussé au sommet, etc.

? **Incisosilis subacuminatus**, ♀. Large, rétréci et subacuminé au sommet, brillant, pubescent de gris, entièrement testacés sauf les yeux, les tarsi et le milieu des antennes qui sont foncés. Antennes grêles ; prothorax très large, subarqué en avant, très relevé sur les côtés en arrière et courtement échancré près des angles postérieurs ; élytres de la largeur du prothorax à la base, très élargis ensuite puis rétrécis et subacuminés à l'extrémité, fortement rebordés, déprimés et creusés sur leur milieu en dessus ; abdomen entaillé et lobé au sommet. Long. 7 mill. Guatemala.

Je suppose que cette nouveauté est une ♀ du genre *Incisosilis* Pic, dont le sexe ♂, ainsi que chez quelques autres genres voisins, est seul bien caractérisé.

**Disema (1) arcuatipes** n. sp. Très allongé, brillant, glabre, noir avec le prothorax, la moitié basale des élytres, la base des cuisses et partie des tibias, dessous du corps (abdomen noir excepté), testacés ou flaves ; dernier article des antennes très long, arqué. Prothorax plus long que large, presque lisse ; élytres étroits, subparallèles, strié-punctués ; ♂ tibias intermédiaires arqués, creusés en dedans, cuisses postérieures sinuées et faiblement dentées. Long. 10 mill. Brésil : Jatahy.

Très voisin de *nigroapicalis* Pic, un peu plus étroit, coloration des pattes différente, etc.

**Disema Soubironi** n. sp. Très allongé, brillant, glabre, testacé avec la tête, l'abdomen, les antennes à 1<sup>er</sup> article

.....  
(1) Toutes les espèces décrites sous le nom de *Disema* offrent une macule matte foncée, celle-ci variable, sur les élytres, en dessous du milieu et près des côtés, plus petite chez ♀ et d'ordinaire grande et en partie bordés de plus chez ♂, les deux premiers ont une forme étroite et parallèle, les autres sont assez larges, les élytres étant un peu élargis derrière le milieu, puis rétrécis et subacuminés au sommet.

taché de roux, et les tarses noirs, élytres testacés, assez largement noirs au sommet ; tibias intermédiaires fortement arqués, creusés et élargis au sommet, tibias postérieurs sinués. Long. 11 mill. Cayenne (Soubiron).

Très voisin du précédent, mais élytres moins largement noirs au sommet et tibias intermédiaires très différents.

**Disema inlateralis v. nov. testaceipes.** Noir avec le prothorax, les cuisses et tibias testacés. Brésil : Goyas.

**Disema appendiculata** n. sp. Peu allongé, brillant, pubescent de gris, noir avec les élytres violacés, prothorax et cuisses, sauf les genoux, testacés ; dernier article des antennes assez long ; prothorax presque carré, à ponctuation forte et écartée ; élytres irrégulièrement striés et transversalement ridés ; cuisses intermédiaires appendiculées au sommet avec les tibias sinués et épaissis, cuisses postérieures dentées et tibias sinués. Long. 8 mill. Brésil : Sao Paulo (E. Gounelle).

Voisin de *collaris* Makl. mais distinct, à première vue, par la structure différente des cuisses intermédiaires.

**Disema Gounellei** n. sp. Peu allongé, brillant, pubescent de gris, entièrement noir ; dernier article des antennes assez long ; prothorax presque carré, à ponctuation forte, peu écartée ; élytres faiblement striés et transversalement ridés ; cuisses postérieures munies d'un appendice large, tronqué au sommet. Long. 8 mill. Brésil : Cerqueira Cesar (E. Gounelle).

Un peu plus allongé que le précédent avec la structure témorale différente.

**Disema subopaca** n. sp. Peu allongé, subopaque, presque glabre avec seulement quelques poils épars, noir ; dernier article des antennes assez long ; prothorax subcarré, à ponctuation irrégulière, médiocre, parsemée de points plus gros ; élytres finement strié-ponctués avec les intervalles larges ; ♂ tibias intermédiaires arqués et un peu élargis au sommet. Long. 10 mill. Brésil : Jatahy.

**Disema brasiliensis** n. sp. Peu allongé, assez brillant, presque glabre avec seulement quelques poils épars, noir de poix plus clair sur le dessous et partie des antennes, cuisses rousses ; dernier article des antennes assez long ; prothorax presque carré, à ponctuation irrégulière et inégale, plus ou moins espacée, élytres strié-punctués, intervalles larges ayant quelques petits tubercules pilifères ; cuisses intermédiaires munies d'une forte dent recourbée. Long. 11 mill. Brésil : Serra de Communaty (E. Gounelle).

Plus brillant que le précédent, élytres avec des traces de petits tubercules, pattes différentes, etc.

**Disema tijuca** n. sp. Peu allongé, brillant, orné de quelques poils épars, roussâtre avec partie du prothorax et du dessous du corps obscurcie ; dernier article des antennes long ; prothorax presque carré, fortement ponctué avec quelques points plus petits, mélangés ; élytres faiblement strié-punctués, les intervalles ayant quelques petits tubercules pilifères ; cuisses intermédiaires dentées. Long. 7 mill. Brésil : Tijuca.

Voisin du précédent, dent des cuisses plus petite, coloration plus claire, etc.

**Disema rufescens** n. sp. ♀. Peu allongé, à peine brillant, éparsément pubescent de gris, roussâtre ; prothorax large, à double ponctuation ; élytres nettement strié-punctués, sans tubercules nets. Long. 8 mill. Cayenne.

Très voisin du précédent, prothorax plus large, élytres plus nettement striés, etc.

**Ceracostira Mocquerysi** n. sp. Grand, allongé, brillant, presque glabre, noir de poix avec les élytres d'un vert métallique, antennes à premier article en partie rembruni, tibias et tarses testacés ; antennes grêles ; prothorax plus long que large, à ponctuation très forte, espacée ; élytres assez fortement striés, les stries ponctuées de points forts qui s'effacent en arrière ; ♂ à tibias intermédiaires élargis au sommet, postérieurs sinués, aplatis et un peu creusés en dedans. Long. 16-19 mill. Gabon (Mocquerys).

Voisin de *rufitarsis* Fairm. avec les tibias testacés.

**Formicomus philippinensis** n. sp. Assez allongé, brillant, orné d'une pubescence grise espacée, parsemée de poils dressés, finement ponctué, parfois avec le milieu du prothorax marqué de points assez gros, testacé, extrémité des antennes, élytres, abdomen et partie des pattes noirs. Tête un peu rétrécie derrière les yeux, subarquée postérieurement ; prothorax plus long que large, modérément dilaté en avant ; élytres oblongs, subacuminés au sommet, à faible dépression antérieure ; pattes rousses avec les cuisses postérieures et les tibias plus ou moins foncés, ♂ cuisses antérieures munies d'une dent émoussée au sommet et tibias antérieurs échancrés en dedans au sommet. Long. 3,5-5 mill. Mindanao dans les îles Philippines. — A placer près de *pygidialis* Pic.

Je dois la connaissance de cette espèce et de la suivante à M. Taxter qui me les a procurées ; ces deux espèces se trouvent, en outre, dans le musée de l'université de Harvard à Cambridge (U. S. A.).

**Tomoderus forticornis** n. sp. Peu allongé, brillant, orné d'une double pubescence, une plus longue redressée, testacé roussâtre avec les antennes, palpes et pattes jaunes. Tête large, à peine arquée en arrière ; antennes assez robustes, à derniers articles courts et larges ; prothorax un peu plus long que large, fortement étranglé, sans sillon distinct ; lobe postérieur très large, presque de la largeur de l'anterieur ; élytres sans impression distincte, assez fortement ponctués en rangées presque régulières. Long. 3,5 mill. République Argentine : Santa-Catalina.

Voisin de *impressipennis* Pic, antennes moins élargies vers l'extrémité, élytres à ponctuation moins forte et moins régulièrement alignée.

**Tomoderus missionensis** n. sp. Un peu robuste, brillant, pubescent de gris, testacé avec les élytres noirs, ces derniers ornés d'une fascie antérieure subsinuée large et d'une macule antéapicale testacées, les deux n'atteignant pas la suture. Tête assez large, subtronquée en arrière, rembrunie derrière les yeux ; antennes relativement grêles ;

prothorax assez court, fortement étranglé, sans sillon distinct, à lobe antérieur large, plus large que le postérieur; élytres à ponctuation assez forte, dense, irrégulière. Long. 3,5 mill. Rép. Argentine : Missiones (1).

Par son dessin crucifère élytral, voisin de *cruciatus* Laf., mais les antennes sont entièrement claires et la coloration noire plus étendue sur les élytres.

**Tomoderus atricollis** n. sp. Robuste, brillant, pubescent de gris, la pubescence en grande partie redressée, noir avec l'abdomen, les 3 derniers articles des antennes et partie des pattes plus clairs ou testacés, élytres jaunes avec une bande basale sinuée étroite, une bande médiane assez large presque droite, celles-ci noires, les deux n'atteignant pas le bord latéral, suture en partie noire. Long. près de 4 mill. Vénézuéla.

Voisin du précédent, plus robuste, plus foncé, avec le prothorax subsillonné sur le disque.

**Macratria obscuripes** n. sp. Allongé et assez étroit, pubescent de gris, foncé avec la tête rougeâtre, celle-ci longue, impressionnée sur le vertex, à ponctuation médiocre, écartée, palpes et antennes testacés, ces derniers ayant leur article terminal peu plus long que le précédent; pattes robustes, foncées avec les genoux et tibias plus ou moins testacés, tarsi testacés; prothorax long, rétréci en avant, à ponctuation assez dense; élytres subparallèles, modérément strié-ponctués. Long. 5-5,5 mill. Célèbes : Toli-Toli.

Voisin de *pallidicornis* Pascae et différant de la var. *distinctipes* Pic par le dessus du corps peu pubescent, les pattes plus foncées, etc.

**Blapida boliviensis** n. sp. Étroit, brillant, noir un peu roux par places, avec des reflets métalliques, membres foncés, élytres jaunes avec la suture étroitement et les épines apicales noires, ces organes strié-ponctués et dépourvus d'impressions. Long. 15 mill. Bolivie.

.....  
(1) Cette espèce m'a été communiquée par M. C. Bruch postérieurement à la possession de mon *type*.

A placer près de *subcærulea* Pic, de coloration élytrale différente avec une forme plus étroite.

**Blapida testaceipes** n. sp. Assez large, acuminé postérieurement, brillant, noir ou noir de poix avec le prothorax et l'écusson roux, les pattes d'un testacé roux à genoux et tarses obscurcis, élytres d'un brun fauve à lignes longitudinales brunes, striés et marqués d'impressions irrégulières, à épine apicale foncée. Long. 22 mill. Brésil.

A placer près de *lineata* Pic, de coloration différente avec les élytres moins allongés.

**Campsia irrorata** v. nov. **obscurior**. Elytres en majeure partie foncés avec des macules fauves irrégulières. Brésil.

**Campsia testacea** v. nov. **testaceicornis**. Relativement allongé, testacé-roussâtre un peu rembruni par places, antennes et pattes testacées avec les cuisses un peu, et en partie, rembrunies. Brésil.

**Statira fulvicollis** v. nov. **discoïdalis**. Un peu allongé, noir, prothorax testacé, élytres ornés antérieurement d'une courte macule discale roussâtre. Long. 6 mill. Cayenne. Se distingue à première vue de la *forme type* par la présence de la macule rousse sur les élytres.

**Ovamela ornatipennis** v. nov. **interrupta**. Fascie antérieure des élytres divisée en 2 macules sur chacun de ces organes. Madagascar : Baie d'Antongil.

**Ovamela ornatipennis** v. nov. **palliditarsis**. Forme élytrale paraissant un peu plus raccourcie que chez la variété précédente, bande antérieure élytrale également divisée, mais macules à contours moins réguliers, tarses testacés. Madagascar : Diégo-Suarez.

---

# Nouveaux « Statira » Serv.

## DE L'AMÉRIQUE MÉRIDIONALE

---

**Statira rubrithorax** (1). Allongé, orné en dessus de longs poils dressés, subopaque sur l'avant-corps, brillant sur le reste, testacé-rougeâtre avec les yeux, antennes, genoux, tibias et tarses noirs, élytres métalliques, d'un bleu verdâtre ou violacé, avec la suture plus ou moins et le sommet interne plus ou moins pourprés, ces organes strié-ponctués avec quelques petits tubercules. Antennes à dernier article très long; prothorax un peu plus long que large, sinué latéralement, à angles postérieurs très marqués; pattes grêles, sans longs poils dressés. Long. 11-12 mill. Brésil. S. Antonio da Barra.

Paraît voisin de *cæruleipennis* Champ., avec une coloration élytrale différente.

**S. arcuatipes**. Assez allongé, brillant, orné en dessus de longs poils dressés, noir avec les élytres d'un vert bleuté métallique, dernier article des antennes très long; prothorax nettement plus long que large, presque indistinctement ponctué, à angles postérieurs peu saillants; élytres strié-ponctués et marqués de quelques impressions irrégulières; cuisses robustes, tibias plus ou moins arqués, 4 cuisses postérieures ayant en dessous une saillie arrondie, large, la médiane pubescente, la postérieure glabre, tibias postérieurs aplatis et creusés. Long. 11 mill. Brésil: Etat de Sao Paulo.

Très distinct de l'espèce précédente par sa coloration et la structure de ses pattes.

**S. tibialis**. Assez allongé, brillant, orné au-dessus de quelques longs poils dressés, noir de poix, plus foncé sur

---

(1) Tous les types des *Statira* Serv. décrits ici font partie de ma collection; un bon nombre de ceux-ci proviennent des riches récoltes de E. Gounelle au Brésil.



l'avant-corps avec les élytres d'un vert métallique. Long. 10 mill. Brésil : Salobro.

Très voisin du précédent, un peu plus étroit de forme, coloration un peu différente et pattes tout autres, les cuisses intermédiaires n'ayant pas de saillie pileuse et les tibias postérieurs étant larges, creusé-aplatis, subsinués.

**S. angustata.** Très étroit et allongé, brillant, paraissant glabre, noir de poix, brunâtre par places avec les élytres d'un bronzé métallique, pattes en partie testacées. Antennes grêles, à dernier article très long ; prothorax presque lisse, un peu plus long que large, sinué latéralement, à angles postérieurs peu saillants ; élytres fortement strié-ponctués, interstries étroits ; pattes grêles, sans longs poils dressés. Long. 12 mill. Equateur.

Par sa forme ressemble à *Othryades fragilicornis* Champ. et me paraît pouvoir se placer près de *S. veræpaxis* Champ.

**S. multinotata.** — Peu allongé, brillant, orné en dessus de quelques longs poils peu dressés, roux avec le dessous plus clair, yeux noirs, élytres jaunes ornés de nombreuses macules noires disposées en rangées, ces organes strié-ponctués avec quelques granules peu distinctes ; prothorax finement ponctué, un peu plus long que large avec les angles postérieurs très saillants ; pattes un peu robustes. Long. 10 mill. Brésil.

Par sa coloration se rapproche de *marmorata* Champ., les pattes sont moins grêles, les taches des élytres régulièrement placées, etc.

**S. viridinotata.** Peu allongé, brillant, orné en dessus de longs poils dressés, testacé avec les yeux noirs, élytres testacés, ornés de deux grandes macules d'un vert métallique, l'une basale, l'autre submédiane et anguleuse en avant, les deux étroitement réunies sur la suture. Antennes grêles, à dernier article très long ; prothorax finement ponctué, un peu plus long que large, angles postérieurs un peu saillants ; élytres fortement striés ; pattes assez grêles. Long. 8 mill. Pérou : Cumbase.

Paraît voisin de *inconstans* Champ. avec un dessin élytral différent.

**S. luteicolor.** Un peu allongé, paraissant glabre, brillant en dessous et sur la tête, presque mat sur le prothorax et les élytres, d'un testacé jaune avec les yeux, antennes, genoux, tibias et tarses noirs. Antennes grêles, à dernier article un peu plus long que l'avant-dernier et roussâtre; prothorax peu plus long que large, ruguleux, sinué sur les côtés avec un faible tubercule médian, angles postérieurs peu marqués; élytres à rangées de points fins; pattes grêles, tibias arqués. Long. 12 mill. Vénézuéla.

Par son prothorax rugueux peut se placer près de *rugicollis* Champ., bien différent par sa coloration.

**S. discoidea.** Assez étroit et allongé, brillant, orné en dessus de longs poils dressés, noir avec le prothorax, l'écusson, la poitrine et la moitié basale des cuisses d'un testacé rougeâtre, élytres testacés avec une macule humérale subtriangulaire et une macule apicale noires, celles-ci communes aux deux étuis. Antennes grêles, à dernier article très long; prothorax éparsément ponctué, peu plus long que large, sinué sur les côtés, à angles postérieurs très sail-lants; élytres assez fortement strié-ponctué; pattes un peu robustes. Long. 9 mill. Brésil: S. Antonio da Barra.

Peut se placer près du précédent par sa forme, mais tout autre par la coloration et la ponctuation du prothorax.

**S. quadrilineata.** Étroit et allongé, brillant, orné en dessus de longs poils dressés, noir avec le prothorax, l'écusson, la poitrine et la majeure partie des pattes d'un testacé rougeâtre, élytres testacés avec, sur chacun, 2 bandes noires assez larges, l'une près de la suture, l'autre près du bord externe et n'atteignant pas le sommet, en outre une petite macule antéapicale noire. Varie par les élytres noirs avec une macule testacé jaune antérieure discale allongée et les tibias foncés (v. **brevilineata**). Long. 9 mill. Brésil.

Très voisin du précédent, élytres un peu plus allongés, à dessins différents.

**S. atripennis.** Etroit et allongé, brillant, entièrement noir à l'exception du prothorax qui est testacé rougeâtre, dernier article des antennes très long. Long. 9 mill. Brésil.

Forme et ponctuation du précédent, dont il n'est peut-être qu'une variété foncée.

**S. nigrolineata.** Un peu allongé, brillant, presque glabre, testacé rougeâtre avec les yeux noirs, élytres d'un testacé pâle avec une étroite bordure suturale, une large bande latérale antérieure et deux lignes discales raccourcies, l'externe étant bien plus courte, celles-ci noires. Antennes grêles ; prothorax presque carré, inégal en dessus ; élytres strié-ponctués ; pattes grêles. Long. 13 mill. Chaco de Bolivie.

Ressemble un peu à *4-lineata* Pic par sa coloration, mais élytres plus larges, prothorax différent, etc.

**S. nigroapicalis.** Peu allongé, brillant, presque glabre, testacé roussâtre avec les yeux, les antennes moins la base, les tarses, l'abdomen et la moitié apicale des élytres noirs. Antennes assez grêles, à dernier article long ; prothorax indistinctement ponctué, presque carré ; élytres fortement strié-ponctués ; pattes un peu robustes, tibias faiblement arqués. Long. 8 mill. Pérou.

Voisin de *bicolor* Champ., en diffère par la macule noire atteignant le sommet des élytres.

**S. brunneiceps.** Assez allongé, brillant, orné en dessus de longs poils dressés, testacé roussâtre avec la tête et les antennes rembrunies, les yeux, pattes, moins les deux tiers de la base des cuisses, et extrême sommet des élytres noirs. Antennes peu grêles, à dernier article long ; prothorax indistinctement ponctué, pas plus long que large, angles postérieurs très saillants ; élytres striés et ornés de points imprimés ou petites granules ; pattes assez grêles. Long. 9 mill. Cayenne.

Voisin de *apicalis* Makl. dont il se distingue, à première vue, par le prothorax non foncé.

**S. bimaculata.** Assez étroit et allongé, un peu brillant,

orné en dessus de longs poils dressés, testacé roussâtre avec la tête, les antennes, les genoux, tibias et tarses noirs, élytres ayant chacun sur le disque, en dessous du milieu, une petite macule subarrondie noire, ces organes faiblement strié-ponctués et ornés de quelques granules. Antennes grêles, à dernier article très long ; prothorax peu plus long que large, sillonné sur le disque et médiocrement ponctué, angles postérieurs très saillants ; pattes grêles. Long. 11 mill. République Argentine.

Voisin du précédent et très particulier par ses élytres bimaculés de noir.

**S. 4-notata.** Peu allongé, assez brillant, orné en dessus de poils dressés, testacé avec les yeux noirs, élytres ayant une étroite bordure basale qui entoure l'écusson et redescend sous les épaules sous forme de ligne prélatérale antérieure et 2 macules discales noires, la 1<sup>re</sup> avant, la 2<sup>e</sup> peu après, le milieu. Antennes grêles, à dernier article pas très long ; prothorax plus long que large, indistinctement ponctué, angles postérieurs un peu saillants ; pattes assez grêles. Long. 9 mill. Brésil : Theresopolis.

Peut se placer près de *evanescens* Champ. et espèces voisines.

**S. sublateralis.** Peu allongé, à peine brillant, presque glabre, d'un roux châtain rembruni par places ; élytres ornés, sur les côtés, d'une bande irrégulière foncée. Antennes assez grêles, à dernier article long ; prothorax presque carré, à peine brillant ; élytres faiblement striés, ornés de quelques points ou petites granules ; pattes peu grêles. Long. 8 mill. République Argentine : Chaco.

Diffère du précédent par l'aspect moins brillant et le dessin élytral.

**S. lunulata.** Un peu élargi, brillant, orné en dessus de longs poils dressés, testacé roussâtre avec les yeux noirs, le prothorax et les élytres ayant des dessins noirs. Antennes grêles, à dernier article long ; prothorax finement ponctué, à peine plus long que large, orné, de chaque côté, d'une bande étroite, noire, angles postérieurs saillants ; élytres

strié-punctués avec quelques gros points ou petites granules, ornés antérieurement d'un cercle noir à contours irréguliers enclosant une macule jaunâtre ; pattes assez robustes. Long. 9 mill. Brésil : Tijuca.

Espèce très distincte par son dessin élytral et pouvant prendre place près de *conspicillata* Champ.

**S. latipes.** Peu allongé, subparallèle, brillant, presque glabre, roux avec l'avant-corps un peu rembruni. Antennes assez robustes, atténuées à l'extrémité, dernier article long ; prothorax court, un peu plus large que long, un peu granuleux, angles postérieurs assez saillants ; élytres strié-punctués ; pattes robustes avec les tibias aplatis. Long. 8 mill. Brésil : Matusinhos.

Espèce très distincte par la forme de ses pattes ; peut se placer provisoirement près de *lunulata* mihi.

**S. notatipennis.** Un peu allongé, brillant, orné en dessus de longs poils dressés, d'un roux châtain avec les yeux et l'abdomen foncés, élytres ornés sur les côtés vers le milieu d'une grande macule noire oblique. Antennes peu grêles, à dernier article long ; prothorax indistinctement ponctué, presque carré, angles postérieurs peu marqués ; élytres finement strié-punctués, ornés de quelques points ; pattes peu grêles. Long. 7 mill. Brésil.

Peut se placer près de *nigromaculata* Champ., la coloration est moins claire et la macule foncée des élytres différente.

**S. brasiliensis.** Peu allongé, brillant, orné en dessus de longs poils dressés, testacé roussâtre avec les yeux noirs, élytres ornés, sur le milieu, d'une macule noire transversale qui émet postérieurement et latéralement un trait arqué en dedans à son extrémité. Antennes grêles, à dernier article long ; prothorax impressionné en avant et en arrière sur son milieu, peu plus long que large, angles postérieurs assez saillants ; élytres faiblement striés, ornés de quelques points ; pattes assez grêles. Long. 5 mill. Brésil.

Diffère du précédent par la forme plus étroite et le dessin foncé des élytres.

**S. goyasensis.** Peu allongé, brillant, orné en dessus et sur les pattes de longs poils, noir de poix, antennes, pattes et devant de la tête testacés, élytres testacés, ornés d'une bande suturale noire élargie vers l'écusson, rebord externe également noir. Antennes assez grêles, à dernier article peu long ; prothorax à ponctuation assez forte et espacée sur le disque, un peu plus long que large, angles postérieurs peu marqués ; élytres strié-ponctués, ornés de quelques points ; pattes peu grêles. Long. 9 mill. Brésil : Goyaz.

Ressemble à *nigripennis* Champ. var. *Championi mihi* (*Biologia Centr. Am.*, IV, pt. 2, Tab. 2, fig. 18), mais le prothorax est obscurci et le dessin noir des élytres un peu différent.

**S. Gounellei.** Un peu allongé, brillant, orné en dessus de quelques longs poils dressés, roux avec les yeux et les pattes noirs, élytres avec une bande suturale noire qui s'élargit postérieurement en couvrant le sommet. Dernier article des antennes pas très long, un peu épaissi ; prothorax à peine plus long que large, indistinctement ponctué ; élytres faiblement strié-ponctués ; pattes assez grêles, les antérieures épaissies. — Var. **insuturalis.** Bande suturale nulle, la macule apicale noire seule existante. Long. 7 mill. Brésil : Caraça.

Peut se placer près de *suturalis* Makl. et aussi près des espèces précédentes.

**S. atricollis.** Oblong, brillant, orné en dessus de longs poils dressés, presque lisse sur l'avant-corps, finement ponctué en rangées sur les élytres, noir avec les élytres ornés, en avant du milieu, d'une macule discale allongée, celle-ci d'un jaune paille. Antennes épaissies à l'extrémité ; prothorax presque carré ; pattes peu robustes. Long. 5 mill. Bolivie.

Voisin de *fulvicollis* F., mais prothorax foncé et élytres maculés.

TITRES DES ARTICLES  
CONTENUS DANS LE QUATRIÈME FASCICULE

---

	Pages
Sur les <i>Hapalochrous</i> Er. africains à élytres bicolores. . . . .	1
Descriptions de 36 espèces et variétés diverses . . . . .	4
Nouveaux <i>Statira</i> Serv. de l'Amérique méridionale. . . . .	14

---

